

レジメン名	対象疾患	1コース期間	抗悪性腫瘍薬・投与スケジュール
セツキシマブ	RAS野生型の結腸・直腸癌	1週間	セツキシマブ 初回 400mg/m ² day1 2コース目以降 250mg/m ² day1
カペシタビン+ベバシズマブ	結腸・直腸癌	3週間	ベバシズマブ 7.5mg/kg day1 カペシタビン 2000mg/m ² /日 day1夕-15朝
パニツムマブ	RAS野生型の結腸・直腸癌	2週間	パニツムマブ 6mg/kg day1
S-1+ベバシズマブ	結腸・直腸癌	6週間	ベバシズマブ 5mg/kg day1, 15, 29 S-1 80-120mg/日 day1夕-29朝
CAPIRI	結腸・直腸癌	3週間	イリノテカン 200mg/m ² day1 カペシタビン 1600mg/m ² /日 day1夕-15朝
CAPIRI+ベバシズマブ	結腸・直腸癌	3週間	ベバシズマブ 7.5mg/kg day1 イリノテカン 200mg/m ² day1 カペシタビン 1600mg/m ² /日 day1夕-15朝
CAPOX	結腸・直腸癌	3週間	オキサリプラチン 130mg/m ² day1 カペシタビン 2000mg/m ² /日 day1夕-15朝
CAPOX+ベバシズマブ	結腸・直腸癌	3週間	ベバシズマブ 7.5mg/kg day1 オキサリプラチン 130mg/m ² day1 カペシタビン 2000mg/m ² /日 day1夕-15朝

FOLFIRI	結腸・直腸癌	2週間	イリノテカン 150mg/m ² day1 レボホリナート 200mg/m ² day1 フルオロウラシル(急速) 400mg/m ² day1 フルオロウラシル(持続) 1200mg/m ² day1 , 2(計46時間)
FOLFIRI+アフリベルセプト	結腸・直腸癌	2週間	アフリベルセプトベータ 4mg/kg day1 イリノテカン 150mg/m ² day1 レボホリナート 200mg/m ² day1 フルオロウラシル(急速) 400mg/m ² day1 フルオロウラシル(持続) 1200mg/m ² day1 , 2(計46時間)
FOLFIRI+ベバシズマブ	結腸・直腸癌	2週間	ベバシズマブ 5mg/kg day1 イリノテカン 150mg/m ² day1 レボホリナート 200mg/m ² day1 フルオロウラシル(急速) 400mg/m ² day1 フルオロウラシル(持続) 1200mg/m ² day1 , 2(計46時間)
FOLFIRI+セツキシマブ	RAS野生型の結腸・直腸癌	2週間	セツキシマブ 初回 400mg/m ² day1, 250mg/m ² day8 2コース目以降 250mg/m ² day1 , 8 イリノテカン 150mg/m ² day1 レボホリナート 200mg/m ² day1 フルオロウラシル(急速) 400mg/m ² day1 フルオロウラシル(持続) 1200mg/m ² day1 , 2(計46時間)
FOLFIRI+パニツムマブ	RAS野生型の結腸・直腸癌	2週間	パニツムマブ 6mg/kg day1 イリノテカン 150mg/m ² day1 レボホリナート 200mg/m ² day1 フルオロウラシル(急速) 400mg/m ² day1 フルオロウラシル(持続) 1200mg/m ² day1 , 2(計46時間)

FOLFIRI+ラムシルマブ	結腸・直腸癌	2週間	ラルシルマブ 8mg/kg day1 イリノテカン 150mg/m ² day1 レボホリナート 200mg/m ² day1 フルオロウラシル(急速) 400mg/m ² day1 フルオロウラシル(持続) 1200mg/m ² day1 , 2(計46時間)
mFOLFOX6	結腸・直腸癌	2週間	オキサリプラチン 85mg/m ² day1 レボホリナート 200mg/m ² day1 フルオロウラシル(急速) 400mg/m ² day1 フルオロウラシル(持続) 1200mg/m ² day1 , 2(計46時間)
mFOLFOX6+ベバシズマブ	結腸・直腸癌	2週間	ベバシズマブ 5mg/kg day1 オキサリプラチン 85mg/m ² day1 レボホリナート 200mg/m ² day1 フルオロウラシル(急速) 400mg/m ² day1 フルオロウラシル(持続) 1200mg/m ² day1 , 2(計46時間)
mFOLFOX6+セツキシマブ	RAS野生型の結腸・直腸癌	2週間	セツキシマブ 初回 400mg/m ² day1, 250mg/m ² day8 2コース目以降 250mg/m ² day1 , 8 オキサリプラチン 85mg/m ² day1 レボホリナート 200mg/m ² day1 フルオロウラシル(急速) 400mg/m ² day1 フルオロウラシル(持続) 1200mg/m ² day1 , 2(計46時間)
mFOLFOX6+パニツムマブ	RAS野生型の結腸・直腸癌	2週間	パニツムマブ 6mg/kg day1 オキサリプラチン 85mg/m ² day1 レボホリナート 200mg/m ² day1 フルオロウラシル(急速) 400mg/m ² day1 フルオロウラシル(持続) 1200mg/m ² day1 , 2(計46時間)

FOLFOXIRI+ベバシズマブ	結腸・直腸癌	2週間	ベバシズマブ 5mg/kg day1 イリノテカン 165mg/m ² day1 (12コースまで) レボホリナート 200mg/m ² day1 オキサリプラチン 85mg/m ² day1 (12コースまで) フルオロウラシル 1600mg/m ² day1, 2(計48時間)
ロンサーフ+ベバシズマブ	結腸・直腸癌	4週間	ベバシズマブ 5mg/kg day1, 15 ロンサーフ 70mg/m ² /日 day1夕-6朝, day8夕-13朝
イリノテカン(2週毎)+セツキシマブ	RAS野生型の結腸・直腸癌	2週間	セツキシマブ 初回 400mg/m ² day1, 250mg/m ² day8 2コース目以降 250mg/m ² day1, 8 イリノテカン 150mg/m ² day1
イリノテカン(毎週)+セツキシマブ	RAS野生型の結腸・直腸癌	6週間	セツキシマブ 初回 400mg/m ² day1 250mg/m ² day8, 15, 22, 29, 36 2コース目以降 250mg/m ² day1, 8, 15, 22, 29, 36 イリノテカン 100mg/m ² day1, 8, 15, 22
S-1+イリノテカン	結腸・直腸癌	3週間	イリノテカン 150mg/m ² day1 S-1 80-120mg/日 day1夕-15朝
S-1+イリノテカン+ベバシズマブ	結腸・直腸癌	3週間	ベバシズマブ 7.5mg/kg day1 イリノテカン 150mg/m ² day1 S-1 80-120mg/日 day1夕-15朝
S-1+イリノテカン+セツキシマブ	RAS野生型の結腸・直腸癌	3週間	セツキシマブ 1コース目 400mg/m ² day1, 250mg/m ² day8, 15 2コース目以降 250mg/m ² day1, 8, 15 イリノテカン 150mg/m ² day1 S-1 80-120mg/日 day1夕-15朝

S-1+イリノテカン+パニツムマブ	RAS野生型の結腸・直腸癌	4週間	パニツムマブ 6mg/kg day1 , 15 イリノテカン 100mg/m ² day1 , 15 S-1 80-120mg/日 day1夕-15朝
SOX	結腸・直腸癌	3週間	オキサリプラチン 130mg/m ² day1 S-1 80-120mg/日 day1夕-15朝
SOX+ベバシズマブ	結腸・直腸癌	3週間	ベバシズマブ 7.5mg/kg day1 オキサリプラチン 130mg/m ² day1 S-1 80-120mg/日 day1夕-15朝
SOX+セツキシマブ	RAS野生型の結腸・直腸癌	3週間	セツキシマブ 1コース目 400mg/m ² day1, 250mg/m ² day8 , 15 2コース目以降 250mg/m ² day1 , 8 ,15 オキサリプラチン 130mg/m ² day1 S-1 80-120mg/日 day1夕-15朝
SOX+パニツムマブ	RAS野生型の結腸・直腸癌	3週間	パニツムマブ 6mg/kg day1 オキサリプラチン 130mg/m ² day1 S-1 80-120mg/日 day1夕-15朝